

ABCL: Gedragsvragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaar

© 2003, ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

De ABCL (Adult Behaviour Checklist) meet vaardigheden en emotionele- en gedragsproblemen van volwassenen op gestandaardiseerde wijze. De score geeft aanwijzingen over probleemgebieden of DSM pathologie.

De ABCL wordt ingevuld door iemand die de volwassene goed kent. De ABCL maakt deel uit van een set vragenlijsten. Zo is er ook een zelfrapportage (ASR; Adult Self Report).

De vragenlijst



Vragen

De ABCL bestaat uit twee delen.

1. Een competentiedeel met vragen over onder andere de opleiding, het werk en vrienden van de volwassene.
2. Een deel over emotionele- en gedragsproblemen met 126 stellingen over het gedrag van de volwassene, bijvoorbeeld “Is te vergeetachtig”. De stellingen kunnen met 0 (helemaal niet), 1 (een beetje of soms) of 2 (duidelijk of vaak) beantwoord worden.

Afnameduur

15-20 minuten

Informanten

Partner, Echtgeno(o)t(e), Ouders, Behandelaar of Ander.

Schalen, scoring en normering



Bij de ABCL worden schalen over Adaptief functioneren, Syndroomschalen en DSM-schalen berekend.

Schalen over adaptief functioneren

1. Vrienden
2. Echtgeno(o)t(e)/partner
3. Persoonlijke sterke punten

Syndroomschalen

1. Angstig/depressief
2. Teruggetrokken
3. Lichamelijke klachten
4. Denkproblemen
5. Aandachtsproblemen
6. Agressief gedrag
7. Regelovertrekend gedrag
8. Intrusief

De syndroomschalen 1 t/m 3 vormen samen de schaal Internaliseren

De syndroomschalen 6 t/m 8 vormen samen de schaal Externaliseren

Alle vragen samen vormen de schaal Totale problemen

DSM-schalen

(gebaseerd op gedragsvragen die overeenkomen met de criteria volgens de DSM-5)

1. Depressieve problemen
2. Angstproblemen
3. Somatische problemen
4. Ontwijkende persoonlijkheidsproblemen
5. Aandachtstekort/Hyperactiviteitproblemen
 - AD/H problemen Inattentie
 - AD/H problemen Hyperactiviteit/Impulsiviteit
6. Antisociale persoonlijkheidsproblemen

In 2014 zijn er nog twee schalen aan toegevoegd

7. Traag Denkt tempo
8. Obsessief-Compulsieve problemen

Naast deze schalen wordt er in het profiel nog getoond hoeveel alcohol, drugs en tabak er wordt gebruikt.

Van elke schaal wordt een Percentielscore en een T-score berekend. Op basis van de T-scores wordt de problematiek van het kind ingedeeld als normaal, subklinisch of klinisch.

Psychometrische gegevens



Er zijn vier normgroepen:

1. Mannen 18-35 jaar
2. Vrouwen 18-35 jaar
3. Mannen 36-59 jaar
4. Vrouwen 36-59 jaar

Dit zijn Amerikaanse normen.

Literatuur en verkrijgbaarheid



De ABCL wordt uitgegeven door ASEBA.

Literatuur:

Achenbach, T.M., & Rescorla, L.A (2003). *Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles*. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.

Meer informatie, zie <http://www.aseba.nl/>

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

- Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn voor zowel de afname als de scoring via BergOp. Heeft u al een papieren lijst afgenomen? Dan betaalt u alleen voor de scoring via BergOp. De prijzen staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met ASEBA, afrekenen verloopt via Praktikon.