

PQ-16: Ervaringenlijst

© 2011, Ising, H., Rietveld, M., Loewy, R., & van der Gaag, M.

De Ervaringenlijst (PQ-16) screent op subklinische psychotische symptomen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op een psychotische stoornis.

De vragenlijst



Vragen

De PQ-16 bestaat uit 16 stellingen met 14 positieve en 2 negatieve symptomen waarbij de informant kan aangeven of deze het ermee 'Eens' of 'Oneens' is. Een voorbeeldstelling is "Ik heb vaak het gevoel dat anderen mij kwaad willen doen". Indien de informant heeft aangegeven het eens te zijn met de stelling, kan deze vervolgens de mate van last aangeven met 0 (geen last), 1 (een beetje last), 2 (nogal wat last) of 3 (veel last).

Afnameduur

5-10 minuten

Informanten

Cliënt/patiënt

Schalen, scoring en normering



Bij de PQ-16 wordt er een Totaalscore en een Lijdensdruk score berekend. De Totaalscore is de het totaal aantal stellingen waarbij de informant heeft ingevuld het ermee eens te zijn. De Lijdensdruk score is de gemiddelde mate van last die de informant ervaart op de deze stellingen waarbij hij/zij heeft gerapporteerd dit te ervaren.

Psychometrische gegevens



De PQ-16 is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. Onderzoek onder 3.533 hulpzoekende patiënten voor een depressie, angststoornis of PTSS wees uit dat de psychometrische eigenschappen van de PQ-16 sterk afhangen van de groep waarin de vragenlijst afgenomen wordt. De PQ-16 is gevalideerd op een groep waarbij de participanten hulpzoekend waren voor een as I- of as II-stoornis anders dan psychose, jonger waren dan 35 jaar en een daling lieten zien in het sociaal functioneren. Op basis van dit onderzoek zijn twee cut-off waarden vastgesteld.

Literatuur en verkrijgbaarheid



De PQ-16 is een verkorte en aangepaste versie van de Prodromal Questionnaire met 92 items. Deze oorspronkelijke 92-item versie is ontwikkeld door Loewy et al. (2005). De herziene versie met 16 items is ontwikkeld door Helga Ising, Marleen Rietveld, Rachel Loewy en Mark van der Gaag bij Parnassia in 2011.

Literatuur

Ising, H.K., Veling, W., Loewy R.L., Rietveld, M.W., Rietdijk, J., Dragt, S., & van der Gaag, M. (2012). The validity of the 16-item version of the Prodromal Questionnaire (PQ-16) to screen for ultra high risk of developing psychosis in the general help-seeking population. *Schizophrenia Bulletin*, 38(6), 1288-1296.

Loewy R.L. et al. (2005). The Prodromal Questionnaire (PQ): Preliminary validation of a self-report screening measure for prodromal and psychotic syndromes. *Schizophrenia Research*, 77(2-3), 141-149.

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken