

STATIC-99R

© 2014, 2017 De Forensische Zorgspecialisten
(Nederlandse vertaling: Smid, Koch & van den Berg)

Het inschatten van het recidiverisico van plegers van een zedendelict is van groot maatschappelijk belang. Met de STATIC-99R geeft u op efficiënte wijze een inschatting van het recidiverisico, de benodigde behandelintensiteit en/of de beveiligingsgraad van de pleger.

De STATIC-99R wordt vaak samen met de STABLE-2007 en ACUTE-2007 gebruikt, de SSA combinatie. [Lees hier meer informatie](#) over het gebruik van deze drie instrumenten.

De vragenlijst



Vragen

Een behandelaar scoort op 10 onderdelen of de risicofactor bij de cliënt van toepassing is.

Afnameduur

Ongeveer 60 minuten

Informanten

Behandelaar

Schalen, scoring en normering



De score op de 10 vragen leidt tot een totaalscore. Op basis van deze score wordt de cliënt ingedeeld in een risicocategorie. Ook worden er percentielscores weergegeven (het percentage dat even hoog of hoger scoort) en kan een recidivepercentage voor een vergelijkbaar scorende cliënt worden weergegeven.

Psychometrische gegevens

Hiervoor kunt u de handleiding bestuderen. Bestel deze via [Eburon](#).



Literatuur en verkrijgbaarheid

De STATIC-99R wordt uitgegeven door De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). [Lees hier meer](#).



BergOp

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

- ➔ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
- ➔ De STATIC-99R mag alleen gebruikt worden door behandelaren die een training hebben gevolgd.

