

SAQOL-39NLg: the Stroke and Aphasia Quality Of Life scale, Generic stroke version

© 2017, Hogeschool Utrecht

Met de SAQOL-39NLg beoordeelt u de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bij mensen die een beroerte hebben gehad en al dan niet een afasie hebben. Om de sociale en maatschappelijke integratie van de persoon met een beroerte te bevorderen en de kwaliteit van leven te verhogen, zijn deze kwaliteitsmetingen erg belangrijk.

De SAQOL-39NLg kan gebruikt worden door klinici en onderzoekers.

De vragenlijst



Vragen

De lijst bestaat uit 39 vragen: 21 vragen gaan over de moeite die de deelnemer de afgelopen week met activiteiten had, zoals aankleden en spreken. 18 vragen gaan over gevoelens (bijvoorbeeld: 'heeft u zich prikkelbaar gevoeld?') en andere activiteiten (bijvoorbeeld: 'heeft u uw vrienden minder vaak gezien dan u zou willen?'). Alle vragen worden middels een 5-puntsschaal beantwoord.

Afnameduur

Ongeveer 20 minuten

Informanten

Cliënt/patiënt na een beroerte met of zonder afasie

Schalen, scoring en normering



De items worden verdeeld over drie hoofddomeinen met de bijbehorende subdomeinen:

Fysiek (16 items)

1. Zelfredzaamheid
2. Mobiliteit
3. Werk
4. Arm-handfunctie

Communicatie (7 items)

5. Taal
6. Impact van de taalproblemen op familie
7. Impact van de taalproblemen op het sociale leven

Psychosociaal (16 items)

8. Denken
9. Persoonlijkheid
10. Stemming
11. Energie en Vermoeidheid
12. Impact van de fysieke conditie op het sociale leven

Van de drie domeinen en de totale score, wordt een percentielscore berekend. Voor de subdomeinen wordt geadviseerd op itemniveau de scores te interpreteren.

Psychometrische gegevens



In 2015 is de SAQOL-39NL genormeerd en getest op betrouwbaarheid en validiteit bij mensen met een chronische afasie (Van Ewijk, Versteegde, Raven-Takken en Hilari, 2017). De betrouwbaarheid bleek goed (α van het gehele instrument = 0.89; subdomeinen: α = 0.84-0.91).

Er zijn drie normgroepen:

- Mensen met chronische afasie
- Mensen met afasie, gemiddeld 3 maanden na start revalidatie
- Mensen zonder afasie, gemiddeld 3 maanden na start revalidatie

Literatuur en verkrijgbaarheid



De SAQOL-39NLg is ontwikkeld bij de Hogeschool Utrecht.

Literatuur

Hilari, K., Byng, S., Lamping, D.L., & Smith S.C. (2003). The stroke and aphasia quality of life scale-39 (SAQOL-39): evaluation of acceptability, reliability and validity. *Stroke*; 34(8): 1944-1950.

Hilari, K., Lamping, D.L., Smith, S.C., Northcott, S., Lamb, A., & Marshall, J. (2009). Psychometric properties of the stroke and aphasia quality of life scale (SAQOL-39) in a generic stroke population. *Clinical Rehabilitation*;23: 544-557.

Van Ewijk, L., Versteegde, L., Raven-Takken, E. & ter Wal, N. (2017). *The stroke and aphasia quality of life scale, generic stroke version, Nederlandse versie, Handleiding*. Hogeschool Utrecht.

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken