

YGTSS (symptom checklist): Yale Global Tic Severity Scale (symptom checklist)

© 2005 Accare

Met de YGTSS (symptom checklist) brengt een behandelaar in kaart welke (enkelvoudige en samengestelde motorische en vocale) tics bij een cliënt voorkomen. Er kan aangegeven worden wanneer de tics ontstaan zijn en of de behandelaar ze geobserveerd heeft.

De vragenlijst



Vragen

De YGTSS (symptom checklist) bestaat uit 42 tics waarbij aangegeven kan worden of deze nooit, vroeger of actueel aanwezig is (geweest), op welke leeftijd de tic is ontstaan en of de behandelaar de tic geobserveerd heeft. Voorbeelden van tics die in de vragenlijst staan, zijn oogknipperen, aanspannen van de buik, copropraxie, kuchen en echolalie.

Afnameduur

15-20 minuten

Informanten

Behandelaar

Schalen, scoring en normering

Er worden geen schaal- en/of totaalscores berekend.



Psychometrische gegevens

Er zijn geen psychometrische resultaten bekend.



Literatuur en verkrijgbaarheid

De YGTSS (symptom checklist) wordt uitgegeven door Accare Groningen (2005).



BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken