

SCI-PANSS - Positive and Negative Syndrome Scale

© 1987 Kay, S.R., Opler, L.A., & Fiszbein, A.

© Nederlandse vertaling: 2000, Wolthaus et al.

De Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) kan worden ingezet in een semigestructureerd interview om vast te stellen of en in welke mate een cliënt last heeft van positieve en negatieve symptomen van schizofrenie. Hiernaast is de PANSS ook geschikt voor het meten van veranderingen in symptomen, zoals bijvoorbeeld als gevolg van verandering in medicatie.

De vragenlijst



Vragen

De PANSS bestaat uit 33 items die de kenmerken van de symptomen beschrijven zoals: waanvoorstellingen of een afgestompt gevoel. Deze kenmerken kunnen beoordeeld worden op een 7-puntsschaal met 1 "Afwezig" 2 "Minimaal" 3 "Licht" 4 "Matig" 5 "Matig ernstig" 6 "Ernstig" 7 "Extreem". Elk item heeft haar eigen verdere gedetailleerde beschrijving van de beoordelingscriteria.

Afnameduur

De duur van het PANSS-interview is ongeveer 30 - 45 minuten.

Informanten

Behandelaar.

Schalen, scoring en normering



De PANSS bestaat uit 3 symptoom schalen en een samengestelde schaal. De samengestelde schaal is de positieve score minus de negatieve score en geeft een bipolaire index, welke essentieel een differentie score is die de mate van predominantie van het ene syndroom tegenover het andere weerspiegelt.

Schalen

1. Positieve symptomen (7 items)
2. Negatieve symptomen (7 items)
3. Algemene psychopathologie (18 items)
4. Samengestelde schaal

Voor elke schaal wordt een ruwe totaalscore berekend met een conversie in percentages.

Psychometrische gegevens



De *voorlopige* normtabel bestaat uit een steekproef van 138 schizofrenen (20 - 68 jaar) met een bevestigde DSM III-diagnose.

De PANSS is niet beoordeeld door de COTAN.

De auteurs hebben wel de psychometrische gegevens onderzocht en de schalen hadden een interne consistentie van .73 of hoger en test-hertest betrouwbaarheid van minimaal .60 voor de schalen (1987, Kay, Opler, & Fiszbein).

Literatuur en verkrijgbaarheid



Literatuur

Kay, S. R., Fiszbein, A., & Opler, L. A. (1987). The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophrenia bulletin*, 13(2), 261-276.

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken